

L'équipe du Codes se joint à moi
pour vous souhaiter une
bonne année 2008.
En espérant que l'InfoSaf poursuive
son objectif qui est d'informer au
mieux le plus grand nombre sur la
thématique Alcool et grossesse.

ETUDES

« Les enfants de femmes qui ont bu sont plus attirés par l'alcool »

Quand une femme enceinte consomme de l'alcool, quelles peuvent être les conséquences pour l'enfant ? Si l'on en croit deux nouvelles études menées chez le rat, ces derniers pourraient être davantage attirés par l'alcool que les enfants de mère n'ayant pas bu.

Le docteur Steven Youngentob et ses collègues de l'université de New York ont mené leur étude sur des rats. Les femelles en gestation ont été séparées en deux groupes, l'un recevant de l'alcool et l'autre non. Les chercheurs ont ensuite observé le comportement vis-à-vis de l'alcool de leur descendance.

Bilan : les jeunes rats de mère ayant bu de l'alcool ont montré très tôt une plus forte propension à en consommer eux-mêmes lorsqu'on leur en proposait. Par ailleurs, leur réponse olfactive à l'odeur de l'alcool était beaucoup plus forte.

Pour les chercheurs, c'est un argument de plus en faveur du « zéro alcool pendant la grossesse ».

Source :

« The effect of gestational ethanol exposure on voluntary ethanol intake in early postnatal and adult rats. »
By Youngentob, Steven L.; Molina, Juan C.; Spear, Norman E.; Youngentob, Lisa M.
In Behavioral Neuroscience. 2007 Dec Vol 121 (6) : 1306-1315.

« Experience-induced fetal plasticity: The effect of gestational ethanol exposure on the behavioral and neurophysiologic olfactory response to ethanol odor in early postnatal and adult rats. »
By Youngentob, Steven L.; Kent, Paul F.; Sheehe, Paul R.; Molina, Juan C.; Spear, Norman E.; Youngentob, Lisa M.
In Behavioral Neuroscience. 2007 Dec Vol 121 (6) : 1293-1305 ⓘ

Résumés des articles sur :

[\[http://content.apa.org/journals/bne/121/6/1293\]](http://content.apa.org/journals/bne/121/6/1293)

[\[http://content.apa.org/journals/bne/121/6/1306\]](http://content.apa.org/journals/bne/121/6/1306)

Consultés le 21/12/2007.

ARTICLE SCIENTIFIQUE

« Addictions: des spécialistes pointent les difficultés du dépistage des conduites alcooliques chez les femmes enceintes »

« Des spécialistes des addictions, qui se sont réunis en congrès fin septembre 2007, ont témoigné du difficile dépistage des conduites alcooliques chez les femmes enceintes et de la nécessité d'une meilleure prise en charge de cette addiction au sein de l'hôpital.

Le Pr Michel Lejoyeux a évoqué en préambule les enjeux de cette prise en charge à l'hôpital, en soulignant que "l'époque où l'on considérait que les addictions ne se traitaient que sur le long terme et non dans l'urgence était révolue". Tout en soulignant "les spécificités de l'alcool, encore largement tabou", le psychiatre a rappelé que la problématique des addictions se traitait "aux trois étapes que sont l'accueil aux urgences, où sont prises en charge les complications somatiques et psychiatriques de ces conduites, l'hospitalisation, à l'occasion d'une pathologie interrécurente liée, et l'inscription, à la sortie, des patients dans un réseau de soins." Le Pr Lejoyeux a recommandé que toute conduite addictive fasse l'objet "d'une évaluation standardisée, une intervention psychothérapeutique 'minimale', d'un repérage du caractère pathologique et d'une proposition de prise en charge immédiate à long terme au besoin". Il a par ailleurs insisté sur la nécessité "d'un abord direct et sans complaisance" avec cette problématique.

Le Dr Mylène Garo a témoigné de son expérience de psychiatre dans une maternité pour "grossesses à hauts risques" et dans un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP). Elle a présenté "les symptômes et les modalités d'alerte" permettant la prévention ou le diagnostic des troubles liés à l'alcoolisme foetal alors que subsiste "une grande méconnaissance des équipes à ce sujet".

Dans la salle, une gynécologue a fait part d'un état des lieux établi sur cinq années dans son service à Dax (Landes), fondé sur une comparaison des dossiers de patientes enceintes non-fumeuses, fumeuses et poly-addictives. "Dès que l'on cumule les critères 'retard de croissance important' du foetus et volume globulaire moyen (VGM) supérieur à 92 micromètre³, la conduite alcoolique est quasi certaine", a-t-elle observé, tout en déplorant l'absence des alcoologues dans les services de gynécologie alors "que les consultations de tabacologie foisonnent". Pourtant, s'il est nécessaire d'aider les femmes enceintes à arrêter de fumer, les séquelles sur le foetus liées au tabac, qui provoque certes un retard de croissance, n'ont pas l'ampleur cataclysmique de celles, irréversibles et handicapantes, causées par l'alcool", a souligné la gynécologue. »

Document en ligne. Disponible sur :

[\[http://www.apmnews.com/depeche.php?](http://www.apmnews.com/depeche.php?Code=CCKIS002)

[Code=CCKIS002\]](http://www.apmnews.com/depeche.php?Code=CCKIS002). Consulté le 11/01/2008 ⓘ

PUBLICATION

« Prise en charge précoce d'enfants porteurs du SAF »

« Les nouveau-nés de mères consommatrices d'alcool et leurs familles constituent une population à gestion difficile en période périnatale. Le Centre d'action médico-sociale précoce (Camsp) vise la prise en charge précoce des enfants âgés de moins de 6 ans présentant des difficultés d'apprentissage liées à des handicaps divers. Son objectif consiste à réduire les handicaps, ou du moins éviter le « sur-handicap ». Sont étudiés les effets de cette prise en charge par le Camsp du Havre à travers le parcours de onze enfants porteurs du syndrome d'alcoolisation fœtale (Saf) ou de ses effets atténués (effets de l'alcool sur le fœtus : Eaf) au moyen d'entretiens semi-directifs avec la directrice du Camsp. » [Extrait de présentation]

Plan du document :

- Caractéristiques des mères
- Caractéristiques des nouveau-nés
- La prise en charge médicale de ces enfants
- L'environnement familial de ces enfants
- L'environnement familial de ces enfants
- Le placement primaire ou secondaire
- Le maintien dans la famille biologique
- La scolarisation des enfants porteurs de ce syndrome
- Conclusion
- Bibliographie

Source : Toutain Stéphanie et al. In *Psychotropes* vol.13, 2007, p. 49 à 68. ⓘ

ARTICLE

« Spécificités de prise en charge de certaines populations. Femmes enceintes toxicomanes et périnatalité »

« Résumé : Les femmes enceintes abusant de substances psychoactives forment un groupe à haut risque de morbidité périnatale. Une prise en charge précoce et intensive, avec la mise en place d'un programme de substitution (méthadone ou buprénorphine haut dosage), par une équipe médico-psychosociale bien formée et motivée et travaillant en réseau ville-hôpital, peut prévenir les complications périnatales et la séparation de la mère et de son enfant. Le pronostic périnatal de ces femmes et de leurs enfants est nettement amélioré, en comparaison avec les données de la littérature. »

Source : Article du Pr Claude Lejeune In *Alcoolologie et addictologie*, 2007, vol.29 (4) : 443-448 ⓘ

ARTICLE SCIENTIFIQUE

« Un cas inhabituel de duplication du canal rachidien »

Cet article relate une malformation congénitale très rare, « dans laquelle les vertèbres Th 9 à 11 sont divisées en corps vertébraux et arcs neurax indépendants. Le canal vertébral contenait la moelle épinière, tandis que l'espace compris entre les corps et les arches est occupé par les racines des nerfs et un cordon vestigial central, dont les relations avec la moelle épinière principale ne sont pas claires. Cette malformation a été considérée comme relevant d'un syndrome d'alcoolisme foetal, comprenant entre autres des malformations crânioc faciales et génitales.

Les auteurs analysent le rôle potentiel de l'expression anormale du gène Sonic Hedgehog dans la pathogénie de cette association malformative. » [Extrait de l'article].

Source : Rangelov N., Sourtzis S., Delpierre I. et al. *An unusual case of duplication of the spinal canal*, In *Revue médicale de Bruxelles* (28), 2007, p. 119-22.

Document en ligne. A télécharger sur : [\[http://www.amub.be/rmb/article.php?id=311\]](http://www.amub.be/rmb/article.php?id=311) ⓘ

DONNEES STATISTIQUES

« Repères sur le syndrome d'alcoolisation fœtale à La Réunion »

Ce document aborde :

- Définition du Saf : « Le SAF, c'est quoi ? »
- Des données statistiques : « LeSAF, en quelques chiffres »
- Présentation de Réunisaf : « Une prévention en réseau : Réunisaf »
- Retour sur l'étude de l'Inpes : « Connaissances des Français sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse »

Observatoire Régional de la Santé de La Réunion, Septembre 2007.

Source : [\[http://www.orsrun.net/TB_BORD/TB_SAF_07.pdf\]](http://www.orsrun.net/TB_BORD/TB_SAF_07.pdf). Consulté le 11/01/2008 ⓘ

PUBLICATION DOCUMENTAIRE

La publication électronique « **SAFMAIL** » n° 7 est disponible à l'adresse suivante :

[\[http://www.alcoolinfo.com/cdpaV2/ressources/doc.asp?nat_id=7\]](http://www.alcoolinfo.com/cdpaV2/ressources/doc.asp?nat_id=7)

Contact SAFMAIL : Sylvie Gadeyne / Sylvie Tavernier - ANPAA 59 - Tél. 03.28.36.47.00 - cdpanord@nordnet.fr

ⓘ signifie que le document est disponible au CODES 29